

Svar fra Sundhedsstyrelsen d. 7. december 2020

Kan personer der er immunsupprimerede, blive vaccineret?

Aktuelt er der ingen godkendte vacciner i EMA og dermed i Danmark. Før der kan gives et endeligt svar på spørgsmålet, skal vaccinerne være godkendt, så vi har tilgængelige produktresumeeer for vaccinerne.

På baggrund af det britiske produktresumee for den nødgodkendte Pfizer/BioNTech vaccine (BNT162b2) har vi dog en formodning om følgende:

Immunkompromitterede personer, inklusiv personer, der er i behandling med immundæmpende lægemidler, kan have et nedsat immunrespons efter vaccination – dvs. de kan have mindre effekt af vaccinen. Der er ikke tilgængelige data om samtidig behandling med immunsupprimerende lægemidler.

Der er altså ikke data, der kan fortælle os, om man kan holde pause i behandlingen (eller i givet fald hvor længe) for dernæst blive vaccineret med forventning om at opnå effekt på niveau med personer, der ikke er i behandling med immundæmpende lægemidler. Men det er forventningen, at personer, der er immunsupprimerede, godt vil kunne blive vaccineret.

Får personer, der ikke kan tåle den vaccine, der er allokeret til dem, tilbudt en anden vaccine?

Personer med nedsat immunforsvar (enten på grund af sygdom eller behandling) kan ofte ikke tåle at blive vaccineret med levende svækkede vacciner. Den vaccineteknologi, der anvendes i de 6 vacciner, som man i Danmark har indgået aftale om forhåndsindkøb om, er ikke baseret på levende svækket vaccine.

Aktuelt er det altså forventningen, at immunsupprimerede personer vil kunne blive vaccineret med alle 6 vacciner, der forventes at kunne komme til Danmark (hvis de bliver godkendt).

På baggrund af det britiske produktresumee for BNT162b2 vaccinen er det forventningen, at de eneste kontraindikationer mod vaccination vil være allergi mod det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne. Det er sandsynligt (men vides endnu ikke med sikkerhed) at det også vil gælde for de øvrige vacciner.

Der forventes altså ikke kontraindikationer mod at vaccinere personer med nedsat immunforsvar. Det er endnu for tidligt at svare på, om personer der ikke kan tåle den vaccine, de bliver tilbudt, vil blive tilbudt en anden vaccine. Typisk vil man ikke på forhånd have viden om, hvorvidt man kan tåle vaccinen. Det vil langt de fleste kunne, men nogle få vil måske reagere med kraftig allergisk reaktion (anafylaksi).

Det er forventningen, at de fleste vacciner skal gives 2 gange. Hvis man har reageret meget kraftigt (anafylaktisk) på første indsprøjtning, vil det kræve en individuel, lægelig vurdering at afgøre, om man skal have anden indsprøjtning.